



# Nieuwsbrief

Stinzentuin Mildenburg



Vrijwilligers Zuid-Hollands Landschap

Maart 2025 - No 2



## Maart

Een wandeling in maart door de tuin.

Inschrijven: [Inschrijven voor de gratis nieuwsbrief](#)

### ***Nieuwsbrief van de "Werkgroep Stinzentuin Mildenburg"***

*Vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap*

O.l.v. René Vervoort en bestaat verder uit

Erik de Boer, Corrie Engelblik, Tienke Bosker, Peter Moree, Hans van Toor en Luuk Vis

***Nieuwsbrief Stinzentuin Mildenburg***

Redactie: Jan Engelblik

Foto's: Jan Engelblik, Peter Moree en René Vervoort

Website: [www.stinzentuin-mildenburg.nl](http://www.stinzentuin-mildenburg.nl)

Contact: [webmaster@stinzentuin-mildenburg.nl](mailto:webmaster@stinzentuin-mildenburg.nl)

Uitschrijven: [Uitschrijven voor de nieuwsbrief](#)

*"Stinzentuin Mildenburg" - bij de ingang van het Mildenburger Bos aan de Donselaer - Oostvoorne*




## Krokus Tommasinianus

Bloeitijd: februari maart

Oorspronkelijk uit de Balkan (Servië, Montenegro, Hongarije en het noordwesten van Bulgarije). Ingeburgerd in enkele West-Europese landen en in Noord-Amerika.

## Vroege sterhyacint


*Scilla bifolia rosea* - Aspergefamilie Bloeitijd: maart - april  
De vroege sterhyacint (*Scilla bifolia*) is een plant uit de aspergefamilie (*Asparagaceae*). In Nederland is ze een stinzenplant, die vooral in het Noorden van Nederland in het wild en op buitenplaatsen in loofbossen op vruchtbare grond voorkomt. De vroege sterhyacint lijkt veel op de Oosterse sterhyacint (*Scilla siberica*), maar bij deze laatste staan de bloemen niet omhoog, maar knikken ze. De plant komt van oorsprong voor in Midden- en Zuid-Europa en in Klein-Azië. In België is de plant inheems in de streek tussen Samber en Maas.





## Anemone blanda

Anemone blanda - Oosterse anemoon  
 Boeitijd: maart / april  
 De oosterse anemoon (Anemone blanda) is een kruidachtige plant uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). De plant wordt 10–20 cm hoog en heeft een knolvormige wortelstok. De bloem heeft acht tot veertien donkerblauw tot blauwviolet bloemdekbladeren. Er komt ook een witte variëteit voor. De wortelbladeren zijn van boven zwak behaard. De bloeitijd valt in maart en april. De soort komt van nature voor in Zuid-Europa in Griekenland en Turkije, maar als verwilderde sierplant komt de plant ook in Midden- en West-Europa voor.





## Wilde- of boshyacint

*Hacinthoides non-scripta* / aspergefamilie

Bloeitijd: maart, april

Op het Europese vasteland zeldzaam, maar in Engeland groeit ze overvloedig.




Winterakonieten





Stinkend nieskruid



Stengelloze sleutelbloem met . . . . .



een citroenvlinder





## Lenteklokje

Bloeitijd: februari maart

Het lenteklokje (*Leucojum vernalis*) is een bolgewas uit de narcisfamilie (*Amaryllidaceae*). Het is een van de twee soorten uit het geslacht *Leucojum*. Uit een rozet van smalle bladeren komt een circa 20 cm hoge bloemstengel. Uit de bloemstengel komen één, soms twee, bolvormig knikkende bloemen. Hierin onderscheidt de soort zich van het zeldzamere en beschermde zomerklokje (*Leucojum aestivum*), dat meestal meer dan twee bloemen per stengel heeft. De bloemen zijn wit en iets breder (2-2,5 cm) dan die van het sneeuw-klokje.





Foto Peter Moree

## Paarse schubwortel

**Orobanchaceae - bremraapfamilie** Bloeitijd: maart - april - mei

De paarse schubwortel staat niet direct in de stinzentuin, maar ergens bij de bosvijver. Ze vormt geen chlorophyl is, parasitair en groeit op wortels van hazelaar en els. Ze onderscheidt zich van de bremrapen (orobanche) door een wortelstok met vlezige schubben en de klokvormige kelk met 4 gelijke lippen.

Door graafwerkzaamheden in het verleden waren we bang dat deze schubwortel verloren was gegaan. Maar tot onze vreugde heeft een deel van de plant het gered.



**Er is nog veel meer te zien, dus....kom naar de stinzentuin!**